Аденокор
Страна-производитель Франция
Фарм-Группа Стимуляторы метаболизма - производные аденозина и гипоксантина

Производители Санофи Винтроп Индустрия(Франция)
Международное название Аденозина фосфат
Синонимы Фосфаден
Лекарственные формы раствор для инъекций 6мг/2мл
Состав Аденозина фосфат.
Показания к применению Пароксизмальная наджелудочковая тахикардия (в т.ч. при синдроме Вольффа-Паркинсона-Уайта), дифференциальная диагностика наджелудочковых тахиаритмий, диагностические электрофизиологические исследования (определение локализации AV блока), ИБС, хронический облитерирующий эндартериит, тромбофлебит, хроническая венозная недостаточность, тромбозы вен; диабетическая ретинопатия, язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки, рассеянный склероз, острая перемежающаяся порфирия, отравление свинцом.
Противопоказания Гиперчувствительность, атриовентрикулярная блокада II и III степени или синдром слабости синусного узла (за исключением больных с искусственным водителем ритма), беременность, геморрагический инсульт, инфаркт миокарда в анамнезе, детский возраст.
Побочное действие Головокружение, фобия, неясность зрения, головная боль, боль в области сердца, тахи- или брадикардия, атриовентрикулярная блокада, приливы, металлический привкус во рту, тошнота, гипервентиляция, бронхоспазм, усиленное потоотделение, боль в руках, спине и шее.
Взаимодействие Дипиридамол усиливает эффект, теофиллин, кофеин и другие ксантины - ослабляют.
Передозировка Нет сведений.
Особые указания Внутривенное введение допустимо только в условиях стационара. Для пациентов, у которых назначение аденозина осложнилось атриовентрикулярной блокадой, при необходимости повторного введения доза не должна превышать первоначальную.
Литература Энциклопедия лекарств, 2003г.