5-Фторурацил-Эбеве
Страна-производитель Австрия
Фарм-Группа Антиметаболиты - аналоги пиримидина

Производители Эбеве Фарма ГмбХ(Австрия)
Международное название Фторурацил
Синонимы Фивофлу, Флуоро - урацил, Флуоро-урацил Рош, Флуороурацил, Флурокс, Флюоро-урацил, Фторурацил, Фторурацил-Дарница, Фторурацил-ЛЭНС, Фторурацил-Тева
Лекарственные формы концентрат для приготовления инфузионного раствора 250мг, концентрат для приготовления инфузионного раствора 500мг, концентрат для приготовления инфузионного раствора 5г, концентрат для приготовления инфузионного раствора 1г, концентрат для приготовления
Состав Действующее вещество - Фторурацил.
Показания к применению Злокачественные опухоли молочной железы, желудка, поджелудочной железы, прямой кишки и др. отделов толстого кишечника.
Противопоказания Гиперчувствительность, кахексия, аплазия костного мозга, тяжелые системные инфекции (или угроза их развития).
Побочное действие Тошнота, рвота, стоматит, эзофагит, проктит, диарея, лейкопения, преимущественно гранулоцитопения, тромбоцитопения, атаксия, головокружение, мышечная слабость, нистагм, невнятная речь, расстройство глазодвигательных функций, стенокардия, ишемия и инфаркт миокарда, кардиомиопатия, случаи внезапной смерти (крайне редко), кожная сыпь; в отдельных случаях - алопеция (обратимая), частичная потеря ногтей, дерматит и гиперпигментация в области ногтевого ложа и др. частях тела.
Взаимодействие Усиливает (взаимно) подавление функции костного мозга и прочие проявления токсичности др. химиотерапевтических препаратов. Фолиниевая кислота увеличивает вероятность поражения ЖКТ.
Передозировка Данных нет.
Особые указания Начальная доза должна быть уменьшена на одну треть или половину в следующих случаях: снижение массы тела, период менее 30 дней после обширного хирургического вмешательства, недостаточная функция костного мозга, нарушение функции печени или почек. Следует соблюдать крайнюю осторожность при введении больным, которые подвергались воздействию высоких доз радиации на область малого таза или получали ранее алкилирующие препараты. Поскольку нет данных о безопасности назначения в период беременности, у женщин с сохраненной детородной функцией следует использовать только в сочетании с адекватной контрацепцией. Кормящие женщины, получающие фторурацил, должны отказаться от грудного вскармливания.
Литература Энциклопедия лекарств 2004 г.