

L-Карнитин

Страна-производитель Швейцария

Фарм-Группа Стимуляторы метаболизма разных химических групп

Производители Лонза Лтд(Швейцария)

Международное название Левокарнитин

Синонимы Карнитен, Мега-Л- Карнитин, Элькар

Лекарственные формы субстанция

Состав Активное вещество - левокарнитин.

Показания к применению Последствия родовой травмы и асфиксии новорожденных, гипотрофия и гипотония новорожденных, респираторный дистресс-синдром у новорожденных, выхаживание недоношенных новорожденных, находящихся на полном парентеральном питании, и детей, которым производится гемодиализ; синдромокомплекс, сходный с синдромом Рейе (гипогликемия, гипокетонемия, кома), развивающийся у детей на фоне приема вальпроевой кислоты; дефицит массы тела у детей и подростков до 16 лет; пропионовая и другие "органические" ацидемии, первичный (генетический) и вторичный дефицит карнитина; нетяжелые формы тиреотоксикоза, экзогенно-конституциональное ожирение, псориаз, себорея, кожные формы склеродермии, кардиомиопатия, миокардит, ишемическая болезнь сердца, гипоперфузия при кардиогенном шоке, миопатии, анорексия, хронические гипoaцидные гастриты, хронический панкреатит с нарушением экзокринной функции, заболевания печени, неврастения, травматическая энцефалопатия, физическое истощение, интенсивные физические нагрузки у спортсменов, профилактика кардиотоксичности при лечении антрациклинами.

Противопоказания Повышенная чувствительность.

Побочное действие Болевые ощущения в эпигастральной области, диспептические явления, мышечная слабость.

Взаимодействие Глюкокортикоиды способствуют накоплению в тканях (кроме печени), другие анаболики усиливают эффект.

Передозировка В случае передозировки возможно усиление побочных явлений. Лечение: прием активированного угля, промывание желудка. При необходимости — симптоматическая терапия.

Особые указания Нет сведений.

Литература Энциклопедия лекарств 2006г.