

Адиуретин-СД

Страна-производитель Чехия

Фарм-Группа Средства на основе гормонов задней доли гипофиза

Производители Ферринг Арцнаймиттель ГмбХ(Чехия)

Международное название Десмопрессин

Синонимы Адиуретин, Адиуретин СД, Минирин, Эмосинт

Лекарственные формы капли назальные 0.1мг/мл

Состав Активное вещество - десмопрессин.

Показания к применению Несахарный диабет, острая полиурия, полидипсия после операции в области гипофиза, первичное ночное недержание мочи (только для интраназального применения, 1, 6, 37, 62); для внутривенного введения - гемофилия А, болезнь Виллебранда (кроме типа IIb, 1, 6, 37, 62); никтурия.

Противопоказания Повышенная чувствительность, анурия, задержка жидкости различной этиологии, врожденная или психогенная полидипсия, гипоосмолярность плазмы, недостаточность кровообращения, необходимость терапии диуретиками. Для внутривенного введения - нестабильная стенокардия, болезнь Виллебранда типа IIb, беременность.

Побочное действие Транзиторная головная боль, тошнота, спастическая боль в животе, дисальгоменорея, умеренная артериальная гипертензия, приливы, умеренное понижение артериального давления, компенсаторная тахикардия (при внутривенном введении), аллергические реакции; отечность, локальная гиперемия, боль в месте инъекции.

Взаимодействие Усиливает эффект вазопрессорных препаратов.

Передозировка Нет данных.

Особые указания Для снижения опасности водной интоксикации и гипонатриемии следует ограничить употребление жидкости (особенно детям, подросткам, людям пожилого возраста) употребление жидкости.

Литература 1. Реестр Лекарственных средств 2004 года., 1. Реестр Лекарственных средств 2004 года.2. Справочник "Лекарственные средства", под редакцией Клюева М. А., 2001 год.