

Адсобар

Страна-производитель Россия , Фармзащита Россия

Фарм-Группа Рентгеноконтрастные средства

Производители Мосхимфармпрепараты им. Н.А. Семашко(Россия),  
Фармзащита(Россия)

Международное название Бария сульфат

Синонимы Бария сульфат для рентгеноскопии, Микропак, Микропак Колон, Микропак Орал, Микропак СТ, Сульфобар, Фалибарит, Фалибарит ХДЕ

Лекарственные формы порошок, порошок 25г

Состав Активное вещество: Бария сульфат.

Показания к применению Рентгенография ЖКТ, особенно верхних отделов тонкого кишечника.

Противопоказания Гиперчувствительность, непроходимость толстой кишки, перфорация ЖКТ, обезвоживание организма, аллергические реакции или бронхиальная астма в анамнезе, муковисцидоз, острый дивертикулит, острый язвенный колит.

Побочное действие Тяжелый и длительный запор, спазмы кишечника, диарея. Анафилактикоидные реакции - свистящее и/или затрудненное дыхание, стесненность в грудной клетке, боль в области желудка и нижней части живота, вздутие живота.

Взаимодействие Нет сведений.

Передозировка Нет сведений.

Особые указания После 20 часов накануне процедуры не рекомендуется употреблять твердую пищу. Перед ректальным введением допускается прием мягкой пищи, утром (перед исследованием) вводят суппозиторий бисакодила. После исследования необходимо употреблять больше жидкости для ускорения эвакуации сульфата бария. При изготовлении суспензии всегда добавлять порошок к воде. Хранят суспензию при 15-30 °С, перед применением взбалтывают.

Литература Энциклопедия лекарств, 2003г.