

## Аерран

Страна-производитель Пуэрто-Рико

Фарм-Группа Средства для ингаляционного наркоза

Производители Бакстер Хелскэа Корпорейшн(Пуэрто-Рико)

Международное название Изофлуран

Синонимы Форан

Лекарственные формы жидкость для ингаляционной анестезии

Состав Активное вещество: Изофлуран.

Показания к применению Ингаляционный наркоз.

Противопоказания Гиперчувствительность, генетическая подверженность злокачественной гипертермии.

Побочное действие В фазе индукции: кашель, затруднение дыхания, ларингоспазм; в фазе наркоза - угнетение дыхания, гипотензия, нарушения ритма; в послеоперационном периоде - легкий озноб, тошнота, рвота, кишечная непроходимость, нарушения функции печени, интеллектуально-мнестические расстройства (2-3 дня после анестезии), ухудшение настроения (в течение 6 дней), лейкоцитоз, транзиторное повышение уровня глюкозы, креатинина, азота мочевины, холестерина и щелочной фосфатазы, синдром злокачественной гипертермии, связанный с гиперкатаболическими процессами в скелетной мускулатуре и резким повышением потребления кислорода, проявляющийся мышечной ригидностью, тахикардией, учащением дыхательных движений, цианозом, нарушениями ритма, нестабильностью артериального давления; снижение парциального давления кислорода и рН, гиперкалиемия, дефицит оснований; почечная недостаточность.

Взаимодействие Комбинация с закисью азота уменьшает минимальную необходимую для наркоза альвеолярную концентрацию, при этом снижается и выраженность артериальной гипотензии. Потенцирует эффект миорелаксантов, особенно недеполяризующего типа.

Передозировка Данных нет.

Особые указания Применяется только под контролем врача-анестезиолога.

Необходим тщательный мониторинг дыхательной функции. У пациентов с заболеваниями коронарных артерий поддержание нормальных гемодинамических показателей особенно важно для предотвращения миокардиальной ишемии.

Транзиторное повышение давления цереброспинальной жидкости в стадии глубокого наркоза корректируется гипервентиляцией. Использование изофлуранового наркоза для проведения аборта может сопровождаться усилением кровопотери.

Литература Энциклопедия лекарств, 2006г.