

Азидотимидин (Тимазид)

Страна-производитель Россия , АЗТ-Фарма Россия , Биофарма Россия
Фарм-Группа Противовирусные - нуклеозиды

Производители АЗТ(Россия), АЗТ-Фарма(Россия), Биофарма(Россия)

Международное название Зидовудин

Синонимы Зидовудин-Ферейн, Ретровир, Ретровир АЗи Ти, Тимазид (Азидотимидин)

Лекарственные формы капсулы 100мг, образец стандартный 0.5г, субстанция

Состав Активное вещество - зидовудин.

Показания к применению Азидотимидин в комбинации с другими антиретровирусными препаратами применяется для лечения ВИЧ-инфекции у взрослых и детей.

Противопоказания Гиперчувствительность, лейкопения (числом нейтрофилов ниже 750/мкл), анемия (содержание гемоглобина менее 7,5 г/дл), тромбоцитопения (уменьшение количества тромбоцитов до 25000/мкл), почечная и/или печеночная недостаточность (цирроз, хронический гепатит). Относительными противопоказаниями к назначению препарата являются рвота, выраженная тошнота. Детский возраст (до 3-х лет).

Побочное действие Анемия (требующая отмены/снижения дозировки препарата, иногда возникает необходимость в гемотрансфузиях), нейтропения и лейкопения, диспепсические расстройства (тошнота, рвота, отсутствие аппетита, боли в животе, диарея, метеоризм), повышение в крови активности "печеночных" трансаминаз, гиперкреатининемия, повышение активности сывороточной амилазы, лихорадка, развитие вторичной инфекции, головная боль, сыпь, боль в мышцах, парестезии, бессонница, ощущение дискомфорта, астения, сонливость, извращение вкуса, кардиалгии, депрессия, учащение мочеиспускания, озноб, кашель.

Взаимодействие Совместное применение парацетамола с зидовудином увеличивает частоту возникновения нейтропении, по-видимому, вследствие угнетения метаболизма зидовудина (оба препарата глюкуронируются). Другие препараты (ацетилсалициловая кислота, морфин, кодеин, индометацин, оксазепам, циметидин, клофибрат) также изменяют метаболизм зидовудина, путем ингибирования активности глюкуронидазы или прямого ингибирования микросомального метаболизма в печени. Одновременное лечение препаратами, обладающими нефротоксическим действием или подавляющими функцию костного мозга (пентамидин, амфотерицин, ганцикловир, винкристин, винбластин и др.), увеличивает риск токсического действия зидовудина. При необходимости проведения антимикробной терапии можно применять ко-тримоксазол; антивирусной противогерпетической терапии - ацикловир. Ингибитор канальцевой секреции - пробеницид увеличивает период полувыведения зидовудина.

Передозировка Нет сведений.

Особые указания Необходимо систематически проводить исследования периферической крови. С особой осторожностью следует назначать препарат больным с почечной и печеночной недостаточностью, а также пожилым больным; в этих случаях рекомендуется коррекция режима дозирования в зависимости от динамики концентрации препарата в крови. Следует соблюдать осторожность при одновременном назначении зидовудина и препаратов, способных изменять его метаболизм в печени. Применение препарата у беременных возможно в случае, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода. При

необходимости применения в период лактации следует прекратить грудное вскармливание.

Литература Энциклопедия Лекарств 2002г. Инструкция по применению препарата Азидотимидин утверждена Фармакологическим комитетом МЗ РФ 15.05.2002 г.