

Аквафор

Страна-производитель Германия

Фарм-Группа Разные диуретические средства

Производители Эли Лилли(Германия)

Международное название Ксипамид

Лекарственные формы таблетки 10мг, таблетки 40мг

Состав Активное вещество: Ксипамид.

Показания к применению Артериальная гипертензия, отечный синдром различного генеза (при хронической сердечной недостаточности, при заболеваниях печени, почек).

Противопоказания Нарушения функции печени, нарушение электролитного баланса, беременность, период лактации, повышенная чувствительность к сульфонидам и ксипамиду.

Побочное действие Гипокалиемия, тошнота, рвота, мышечная слабость, изменения ЭКГ, аритмия, сухость во рту, нарушения зрения, боли в животе, запор, аллергические реакции.

Взаимодействие При одновременном приеме с другими диуретиками и антигипертензивными средствами возможно понижение АД. При одновременном назначении с гипогликемическими и противоподагрическими средствами, норадреналином и адреналином эффекты этих препаратов могут уменьшаться. Нервно-мышечная блокада может усиливаться при одновременном применении ксипамида и недеполяризующих миорелаксантов.

Передозировка Данных нет.

Особые указания Необходимо контролировать уровень калия и натрия в крови, мочевины, креатинина, глюкозы и липидов. С осторожностью следует принимать пациентам, работа которых требует повышенного внимания и быстрой реакции.

Литература Справочник "Лекарственные средства", М. А. Ключев, 2001г., Справочник "Лекарственные средства", М. А. Ключев, 2001г.