Акинетон

Страна-производитель Германия, Эбботт ГмбX Германия Фарм-Группа Противопаркинсонические антихолинергические средства

Производители Кнолль АГ(Германия), Эбботт ГмбХ(Германия)

Международное название Бипериден

Синонимы Акинетон СР

Лекарственные формы таблетки 2мг, раствор для инъекций 5мг/мл, раствор для инъекций 5мг

Состав Активное вещество - бипериден.

Показания к применению Синдром Паркинсона, экстрапирамидные расстройства, дискинезии, акинезии при лечении нейролептиками и другими препаратами.

Противопоказания Закрытоугольная глаукома, мегаколон, гипертрофия предстательной железы, непроходимость ЖКТ, тахиаритмии, беременность, лактация.

Побочное действие Нарушение аккомодации, утомляемость, головокружение, сонливость, спутанность сознания, нарушение памяти, галлюцинации, сухость во рту, диспептические расстройства, тахикардия, понижение артериального давления, лекарственная зависимость.

Взаимодействие Хинидин повышает холинолитическое влияние, леводопа - риск развития дискинезии. Усиливает эффекты холинолитиков, антигистаминных, противопаркинсонических и противосудорожных средств, ослабляет - метоклопрамида. Несовместим с алкоголем.

Передозировка Симптомы: выраженные холинолитические эффекты.Лечение: симптоматическое. Возможно применение ингибиторов холинэстеразы.

Особые указания С осторожностью назначают при атеросклерозе сосудов головного мозга (пожилой возраст), больным эпилепсией (следует учитывать возможность развития судорожного синдрома). Прекращают лечение постепенно (высока вероятность появления абстиненции). Пациентам, принимающим препарат, следует воздерживаться от занятий потенциально опасными видами деятельности, требующими быстроты психической и двигательной реакций.

Литература 1. Энциклопедия лекарств, 2004г2. М.Д. Машковский "Лекарственные средства" изд. №14, 2000г., Энциклопедия лекарств, 2004гМ.Д. Машковский "Лекарственные средства" изд. №14, 2000г.