Аккупро

Страна-производитель Германия, Гедеке/Парке-Дейвис Германия
Фарм-Группа Антигипертензивные - ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента

Производители Гедеке ГмбХ(Германия), Гедеке/Парке-Дейвис(Германия)
Международное название Хинаприл
Лекарственные формы таблетки покрытые оболочкой 5мг, таблетки покрытые оболочкой 10мг, таблетки покрытые оболочкой 20мг
Состав Активное вещество - хинаприл.

Показания к применению Артериальная гипертония, хроническая сердечная недостаточность.

Противопоказания Гиперчувствительность, ангионевротический отек, стеноз почечных артерий, порок митрального клапана, гипертрофическая миокардиопатия, первичный гиперальдостеронизм, выраженные нарушения функции почек (Клиренс креатинина менее 30 мл/мин), состояние после трансплантации почки, тяжелая сердечная недостаточность в фазе декомпенсации, беременность, кормление грудью (на время лечения прекращают), детский и подростковый возраст (до 14 лет).

Побочное действие Артериальная гипотензия, тахикардия, нарушения ритма, ишемия миокарда, ишемический инсульт, ухудшение периферического кровообращения, головокружение, слабость, нарушение зрения, протеинурия, острая почечная недостаточность, сухой кашель, бронхит, синусит, бронхоспазм, миалгии, артралгии, транзиторная тромбоцитопения, лейкопения, олигурия, повышение концентрации креатинина и мочевины в плазме крови, фотосенсибилизация, кожная сыпь, зуд.

Взаимодействие При совместном назначении с др. гипотензивными препаратами - аддитивный эффект, калийсберегающими диуретиками - гиперкалиемия, литием - повышение литиевой токсичности, антацидами - увеличение абсорбции. Аллопуринол, прокаинамид, цистостатики и глюкокортикоиды усиливают лейкопению, а НПВС, опиоидные анальгетики, снотворные средства и общие анестетики повышают гипотензивное влияние. Всасывание уменьшается антибиотиками тетрациклинового ряда, усиливает действие алкоголя.

Передозировка Нет данных.

Особые указания Рекомендуется применять только в условиях стационара. С осторожностью назначают пациентам с иммунопатологическими и депрессивными состояниями. За 2-3 дня до начала курса следует отменить диуретики и скорректировать водно-электролитный баланс. Необходимо тщательно контролировать артериальное давление, особенно у пациентов старше 65 лет. Пациентам с выраженными нарушениями функции почек дозы снижают в два раза. В ходе терапии исключается прием алкоголя.

Литература 1. Регистр Лекарственных средств 2001 года.