Аколат
Страна-производитель Великобритания
Фарм-Группа Бронхолитические средства-антагонисты лейкотриенов

Производители Зенека(Великобритания)
Международное название Зафирлукаст
Лекарственные формы таблетки 20мг, таблетки 40мг
Состав Действующее вещество - зафирлукаст.
Показания к применению Бронхиальная астма (профилактика приступов и поддерживающая терапия), в т.ч. при неэффективности бета-стимуляторов.
Противопоказания Гиперчувствительность, детский возраст до 12 лет (безопасность и эффективность применения у детей не определены).Применение при беременности и кормлении грудью: Возможно, если ожидаемый эффект терапии превышает потенциальный риск для плода. На время лечения следует прекратить грудное вскармливание.
Побочное действие Головная боль, нарушения со стороны ЖКТ, аллергические реакции (крапивница, ангионевротический отек), сыпь (включая везикулярную), редко - отек нижних конечностей, артралгия, миалгия, симптоматический гепатит, кровотечения, образование гематом при ушибах, агранулоцитоз, инфекции дыхательных путей у пожилых пациентов, повышение уровня сывороточных трансаминаз, гипербилирубинемия.
Взаимодействие Концентрацию зафирлукаста в плазме повышает ацетилсалициловая кислота, снижают - эритромицин и теофиллин. Сочетание с варфарином пролонгирует протромбиновое время на 35%.
Передозировка Данных нет.
Особые указания Не рекомендуется назначать при нарушениях функции печени. Нельзя применять для купирования бронхоспазма.
Литература Энциклопедия лекарств 2006г.