Акридерм ГК
Страна-производитель Россия
Фарм-Группа Комбинированные средства содержащие глюкокортикостероиды

Производители Акрихин ХФК(Россия)
Международное название Гентамицин+Бетаметазон+Клотримазол
Синонимы Тридерм
Лекарственные формы крем
Состав Действующее вещество - Бетаметазон дипропионат, гентамицина сульфат, клотримазол.
Показания к применению Дерматозы, осложненных первичной и вторичной инфекцией, при лечении эпидермофитии стоп, отрубевидного лишая, дерматомикоза (в т.ч. пахового), вызванного чувствительными к препарату возбудителями.
Противопоказания Гиперчувствительность к какому-либо из компонентов препарата.туберкулез кожи, кожные реакции после вакцинации, ветряная оспа, кожные проявления сифилиса, сахарный диабет, глаукома, беременность, грудное вскармливание, детский возраст до 7 лет.
Побочное действие Местные реакции: чувство жжения, эритема, экссудация, нарушение пигментации, зуд.Побочные реакции, обусловленные бетаметазоном: чувство жжения, зуд, раздражение и сухость кожи, фолликулит, гипертрихоз, угревидные высыпания, гипопигментация, периоральный дерматит, мацерация кожи, вторичная инфекция, атрофия кожи, стрии, потница.Побочные реакции, обусловленные клотримазолом: эритема, шелушение, локальный отек, зуд, крапивница, мацерация кожи, парестезии.Побочные реакции, обусловленные гентамицином: гиперемия, зуд.
Взаимодействие Данных нет.
Передозировка Симптомы: при превышении доз: увеличение массы тела, отеки, гипертензия, глюкозурия, гипокалиемия.Лечение: симптоматическое.
Особые указания Нельзя применять в офтальмологической практике. Любые побочные эффекты, встречающиеся при применении системных глюкокортикостероидов, включая угнетение функции коры надпочечников, могут отмечаться и при местном применении глюкокортикостероидов, в особенности у детей.Системная абсорбция глюкокортикостероидов или гентамицина при местном применении будет выше, если лечение будет проводиться на больших поверхностях тела или при использовании окклюзионных повязок. Необходимо избегать нанесения гентамицина на открытые раны или повреждения кожи. Следует соблюдать соответствующие меры предосторожности в таких случаях, особенно при лечении детей.Отмену препарата после длительного использования рекомендуется проводить постепенно.При применении, как и многих других топических глюкокортикостероидов на обширных поверхностях и/или с окклюзионной повязкой возможно подавление функции гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы, может наблюдаться снижение экскреции гормона роста, а также повышение внутричерепного давления.
Литература Энциклопедия лекарств 2004 г.