

Акридерм СК

Страна-производитель Россия

Фарм-Группа Комбинированные средства содержащие глюкокортикостероиды

Производители Акрихин ХФК(Россия)

Международное название Бетаметазон+Салициловая кислота

Синонимы Белосалик, Бетадермик, Бетноейт С, Дипросалик

Лекарственные формы мазь

Состав Активные вещества - бетаметазона дипропионат и салициловая кислота.

Показания к применению Дерматозы (подострые, хронические), чувствительные к наружной терапии глюкокортикоидами и сопровождающиеся гиперкератозом: псориаз, красный плоский лишай, экзема, дисгидратический дерматит, атопический дерматит (нейродермит), ихтиоз и ихтиозоформные изменения.

Противопоказания Гиперчувствительность, туберкулез кожи, вирусные инфекции кожи, вакцинация, периоральный дерматит, розовые угри. Применение при беременности и кормлении грудью: Возможно при беременности, если ожидаемый эффект терапии превышает потенциальный риск для плода (непродолжительное время и на небольших поверхностях). Возможно при кормлении грудью (непродолжительное время и на небольших поверхностях, исключая кожу молочной железы перед кормлением).

Побочное действие Местные - ощущение жжения, зуд, фолликулит, акне, стрии, атрофия кожи, депигментация, гипертрихоз. Системные (при длительном применении на больших участках кожи, при использовании окклюзионных повязок) - симптомы передозировки глюкокортикоидов (задержка роста, обратимое подавление высвобождения АКТГ, синдром Кушинга, повышение внутричерепного давления после окончания лечения, гипергликемия) или салицилатов (бледность, утомляемость, сонливость, гипервентиляция легких, тахипноэ, тошнота, рвота, нарушение слуха, спутанность сознания и др.).

Взаимодействие Нет данных.

Передозировка Симптомы: угнетение функции гипофизо-надпочечниковой системы, ведущее к вторичной недостаточности функции надпочечников и явлениям гиперкортицизма, включая болезнь Кушинга. Лечение: систематическая терапия.

Особые указания Применение препарата у детей младше 12 лет проводят под наблюдением лечащего врача. Не рекомендуется длительное применение на коже лица. Не следует наносить препарат на кожу вблизи глаз. Следует избегать применения в аногенитальной области. Следует соблюдать осторожность пациентам с нарушением функции печени.

Литература 1. Энциклопедия лекарств, 2004г. 2. Энциклопедия лекарств, 2003г.