

Акрипамид

Страна-производитель Россия

Фарм-Группа Петлевые диуретики

Производители Акрихин ХФК(Россия)

Международное название Индапамид

Синонимы Ариндап, Арифон, Арифон ретард, Веро-Индапамид, Индап, Индапамид, Индапамид МВ, Индапамид Никомед, Индапамид Польфарма, Индапамид-Верте, Индапрессин, Индапсан, Ионик, Ионик ретард, Лорвас, Памид, Равел СР

Лекарственные формы таблетки покрытые оболочкой 2.5мг

Состав Действующее вещество - индапамид.

Показания к применению Артериальная гипертензия, хроническая сердечная недостаточность.

Противопоказания Повышенная чувствительность, нарушения мозгового кровообращения, тяжелая печеночная недостаточность, сахарный диабет в состоянии декомпенсации, подагра, беременность и лактация.

Побочное действие Слабость, ортостатическая гипотония, гиперурикемия, гипокалиемия, тошнота, боли в эпигастрии, диарея, судороги, аллергические реакции.

Взаимодействие Усиливает действие гипотензивных препаратов, повышает риск гипокалиемии на фоне калийвыводящих диуретиков.

Передозировка Симптомы: слабость, нарушение водно-электролитного баланса, угнетение дыхания, гипотония. Лечение: коррекция водно-электролитного баланса, возможно промывание желудка.

Особые указания Необходимо контролировать уровень калия в крови при назначении больным с заболеваниями печени и почек . У больных с гиперурикемией рекомендуется регулярно определять содержание мочевой кислоты в крови. Не следует сочетать с препаратами лития, винкамином, калийвыводящими диуретиками.

Литература Энциклопедия лекарств 2004 г.