Аксамон
Страна-производитель Россия
Фарм-Группа Ингибиторы холинэстеразы

Производители Пик-Фарма(Россия)
Международное название Ипидакрин
Синонимы Нейромидин
Лекарственные формы таблетки 0.02г
Состав Активное вещество: Ипидакрин.
Показания к применению Заболевания периферической нервной системы у взрослых (неврит, полиневрит, полинейропатия, полирадикулонейропатия, миастения, 1, 6, 37, 62); бульбарный паралич и парезы, органические поражения ЦНС, сопровождающиеся нервными нарушениями (восстановительный период, 1, 6, 37, 62); демиелинизирующие заболевания (комплексная терапия), атония кишечника.
Противопоказания Гиперчувствительность, эпилепсия, экстрапирамидные расстройства, выраженная брадикардия, стенокардия, бронхиальная астма, вестибулярные расстройства, язвенная болезнь желудка в стадии обострения, беременность, кормление грудью.
Побочное действие Головокружение, брадикардия (может быть устранена м-холиноблокаторами),гиперсаливация (может быть устранена м-холиноблокаторами), тошнота, рвота, зуд, сыпь.
Взаимодействие Усиливает седативный эффект средств, угнетающих ЦНС. М-холиномиметики, другие ингибиторы холинэстеразы усиливают действие и побочные эффекты (увеличивается риск возникновения холинергического криза, особенно у больных миастенией). Бета-адреноблокаторы вызывают брадикардию, если они применялись до начала лечения Нейромидином. При одновременном применении с алкоголем возможно усиление неблагоприятных побочных явлений.
Передозировка Лечение: назначение м-холинолитиков, в т.ч. атропина, циклодола и др.
Особые указания Препарат увеличивает мышечный тонус матки и может вызвать преждевременную родовую деятельность. С осторожностью следует назначать при язве желудка, тиреотоксикозе, заболеваниях сердечно-сосудистой системы.Препарат хорошо проникает в ткани и органы, в т.ч. головной мозг и может оказывать седативное действие. Следует соблюдать осторожность при работе с механизмами. Во время лечения нельзя употреблять алкоголь.
Литература 1. Энциклопедия лекарств, 2005г.2. Инструкция по медицинскому применению препарата "Аксамон".