

Активизе

Страна-производитель Германия

Фарм-Группа Фибринолитические средства

Производители Берингер Ингельхайм(Германия)

Международное название Алтеплаза

Лекарственные формы порошок лиофилизированный для приготовления инъекционного раствора 50мг

Состав Активное вещество - алтеплаза.

Показания к применению Инфаркт миокарда (в первые 6-12 часов), острая массивная тромбоэмболия легочной артерии.

Противопоказания Геморрагический диатез, одновременный прием непрямых антикоагулянтов, внутреннее кровотечение, нарушение мозгового кровообращения, новообразования с повышенным риском кровотечения, аневризмы и пороки развития сосудов, интракраниальные или спинальные хирургические вмешательства в течение 2-х предшествующих месяцев, геморрагическая ретинопатия, период до 10 дней после тяжелой травмы, травматического открытого массажа сердца, обширных хирургических операций, родов, пункции сосудов с низким давлением, в т.ч. подключичной и яремной вены, тяжелая неконтролируемая артериальная гипертензия, бактериальный эндокардит, перикардит, острый панкреатит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в течение 3 месяцев после обострения, печеночная недостаточность, цирроз печени, портальная гипертензия, сопровождающаяся варикозным расширением вен пищевода, активный гепатит. Ограничения к применению: недавно перенесенные небольшие травмы в результате биопсии, пункции сосудов, в/м инъекции, массажа сердца и другие состояния, сопровождающиеся риском развития кровотечений.

Побочное действие Кровотечение: наружное (из места пункции, поврежденных сосудов, носа, десен) и внутреннее (в ЖКТ, мочеполовом тракте, ретроперитонеальном пространстве, ЦНС, в том числе внутричерепное, из паренхиматозных органов, 1, 6, 37, 62); аритмия (при успешной реканализации коронарных артерий у больных с острым инфарктом миокарда), очень редко - холестеринемия или тромботическая эмболия, в том числе почек с развитием почечной недостаточности, тошнота, рвота и понижение артериального давления.

Взаимодействие Риск кровотечений повышается при одновременном использовании производных кумарина, антиагрегантов, гепарина и других препаратов, угнетающих свертывание крови.

Передозировка Симптомы: понижение концентрации фибриногена и факторов свертывания крови, кровотечения (поверхностные, из ЖКТ, мочевого и полового тракта, паренхиматозных органов, 1, 6, 37, 62); ретроперитонеальные гематомы, геморрагии в ЦНС. Лечение: введение свежезамороженной плазмы

Особые указания Применение при беременности и кормлении грудью возможно, если ожидаемый эффект терапии превышает потенциальный риск для плода. Следует учитывать, что у пожилых пациентов возможно повышение как терапевтической эффективности, так и риска внутричерепного кровоизлияния. Опыт применения у детей ограничен. При дозах, превышающих 100 мг увеличивается риск развития внутричерепного кровоизлияния. Одновременно с введением препарата рекомендуется

назначение ацетилсалициловой кислоты и гепарина. При возникновении кровотечения следует прекратить введение. Актилизе нельзя смешивать с другими препаратами (даже гепарином) ни в общем флаконе для инфузий, ни в общем катетере.

Литература Энциклопедия лекарств 2003г.