Абитаксел
Страна-производитель Аргентина , Тева Фармацевтические предприятия Лтд Израиль

Фарм-Группа Алкалоиды и другие цитостатические ср-ва растительного происхождения

Производители Лаборатория Хемепе(Аргентина), Тева Фармацевтические предприятия Лтд(Израиль)
Международное название Паклитаксел
Синонимы Интаксел, Митотакс, Паклитакс, Паклитаксел-Лэнс, Паклитаксел-Эбеве, Паксен, Таксол, Ютаксан
Лекарственные формы концентрат для приготовления инфузионного раствора 30мг/5мл, концентрат для приготовления инфузионного раствора 100мг/16,7мл, концентрат для приготовления инфузионного раствора 6мг/мл
Состав Действующее вещество - паклитаксел.
Показания к применению Метастатический рак яичников: химиотерапия первой (в комбинации с прапаратами платины) и второй линии, прогрессирование процесса, в т. ч. при резистентности к препаратам платины, метастатический рак молочной железы (в комбинации с антрациклинами или монотерапия при резистентности к ним), немелкоклеточный рак легкого, плоскоклеточный рак головы и шеи, переходноклеточный рак мочевого пузыря, рак пищевода, лейкемия, саркома Капоши у больных СПИДом.
Противопоказания Гиперчувствительность, выраженная нейтропения и тромбоцитопения, нарушение функции печени, вирусные инфекции, угнетение костномозгового кроветворения после предшествующей химио- или лучевой терапии, заболевания сердечно-сосудистой системы, беременность, кормление грудью.
Побочное действие Угнетение костномозгового кроветворения, аллопеция, тошнота, рвота, анорексия, диарея, мукозит, обструкция и перфорация кишечника, тромбоз брыжеечных сосудов, ишемический колит, повышение уровня щелочной фосфатазы, билирубина и др. функциональных показателей печени, снижение толерантности к инфекциям, бради- и тахикардия, гипо- и гипертензия, нарушения AV проводимости, периферические нейропатии, атаксия, эпилептические припадки, энцефалопатии, изменение остроты зрения и др. неврологические расстройства, артралгия, миалгия, аллергические реакции , реакции в месте введения.
Взаимодействие Введение после цисплатина (при поочередной инфузии препаратов) усиливает угнетение костного мозга и приводит к снижению Cl (на 20%). Кетоконазол снижает биотрансформацию.
Передозировка Симптомы: миелосупрессия, периферическая нейротоксичность, мукозиты.Лечение: симптоматическое.
Особые указания Лечение должно проводиться врачом. Обязателен постоянный контроль периферической крови, АД, ЧСС, и др. параметров жизненно важных функций. Во избежание развития тяжелых реакций гиперчувствительности перед инфузией всем пациентам следует проводить премедикацию глюкокортикоидами, антигистаминными препаратами и блокаторами гистаминовых Н-2-рецепторов. При возникновении тяжелых аллергических реакций во время инфузии введение немедленно прекращают и проводят симптоматическую терапию. С осторожностью

применяют при работе с механизмами и машинами и др. видами деятельности, требующих точности действий (содержит этанол). Во время лечения рекомендуется использовать адекватные методы предупреждения беременности.Более подробную информацию см. инструкцию по применению.

Литература Энциклопедия лекарств 2004 год.