

Аводарт

Страна-производитель Франция

Фарм-Группа Средства для лечения и профилактики заболеваний предстательной железы

Производители ГлаксоСмитКляйн/РП Шерер(Франция)

Международное название Дутастерид

Лекарственные формы капсулы 0.5мг

Состав Активное вещество - дутастерид.

Показания к применению Лечение и профилактика доброкачественной гиперплазии предстательной железы (уменьшает ее размеры, улучшает мочеиспускание и снижает риск возникновения острой задержки мочи и потребности в хирургическом лечении).

Противопоказания Гиперчувствительность к дутастериду, другим ингибиторам 5 $\alpha$ -редуктазы или к любому ингредиенту препарата. Дутастерид противопоказан женщинам и детям.

Побочное действие Импотенция, снижение либидо, нарушение эякуляции, гинекомастия (включает болезненность и увеличение грудных желез), аллергические реакции (кожная сыпь, зуд, крапивница, локализованный отек).

Взаимодействие Ингибиторы СYP3A4 могут повышать концентрацию дутастерида в плазме крови. Ингибиторы СYP3A4 (верапамил и дилтиазем) снижают клиренс дутастерида. Снижение клиренса дутастерида и последующее повышение его концентрации в крови, при одновременном применении с ингибиторами СYP3A4, не является клинически значимым (нет необходимости в снижении дозы).

Передозировка Данных нет.

Особые указания Дутастерид абсорбируется через кожу, поэтому женщины и дети должны избегать контакта с поврежденными капсулами. В случае контакта с поврежденными капсулами необходимо сразу промыть соответствующий участок кожи водой с мылом. Влияние на выявление простат-специфического антигена и рака предстательной железы. У пациентов с доброкачественной гиперплазией предстательной железы необходимо до начала и периодически во время лечения проводить необходимые исследования предстательной железы для исключения развития рака предстательной железы. Прием дутастерида не влияет на вождение автомобиля и работу с механизмами.

Литература Инструкция по медицинскому применению препарата Аводарт.